


Uso de crema de lidocaína para reducir el dolor durante la colocación de una vía intravenosa (IV)

Se pueden utilizar productos de lidocaína al 4% de venta libre para disminuir el dolor asociado con los pinchazos en los niños. No lo utilice si el niño es alérgico a estos productos o a alguno de sus ingredientes o al envoltorio de plástico, o si presenta cualquier otra contraindicación para el uso de la crema de lidocaína.




Consejos útiles:

- Coloque una cantidad de crema de lidocaína al %4 equivalente a dos monedas de un centavo apiladas para bebés, y aumente la cantidad hasta el tamaño de una moneda de veinticinco centavos para niños mayores, en la parte interna de los pliegues (área AC) de ambos brazos al menos 30 minutos antes del procedimiento radiológico.
- Intente cubrir todas las líneas azules de la parte interna del codo, pero no frote la crema.
- No aplique crema sobre la piel lesionada. Cubra con un Tegaderm, Pres'n Seal o envoltura plástica
- Anime al niño a que lo deje puesto proporcionándole una explicación, redirigiéndolo hacia otro objeto y jugando con él.
- No deje a un niño sin supervisión.
- No permita que el plástico cubra la boca o la nariz del niño, ya que esto puede suponer un riesgo de asfixia.
- Aplique crema de lidocaína en la vena azul/verde de la parte interna de AMBOS brazos para que haya opciones para utilizar la mejor vena.

Explicación apropiada para un niño antes de comenzar la colocación de una vía intravenosa

"Tu cuerpo necesita un medicamento que solo se puede administrar por vía intravenosa." Este medicamento es un marcador especial del hospital que ayudará con la imagen que se le realizará hoy. Una vía intravenosa es un pequeño tubo que se coloca en las venas, las líneas azules/verdes que a veces se pueden ver en los brazos y las manos de una persona. Se hará un pequeño pinchazo para colocar el tubo y esta crema servirá para que el pinchazo no duela tanto. Puede que sientas un pequeño pellizco o empujón. Tu trabajo consiste en sentarte a salvo en mis brazos o a mi lado, mantener el brazo quieto como una estatua y jugar". Vamos a _____ (haga una sugerencia o dé opciones de distracción, como jugar con mi teléfono, soplar burbujas o apretar una pelota sensorial) para ayudar si lo necesita.



Escanee el código QR para ver un breve vídeo de 3 minutos y obtener más información sobre cómo apoyar a su hijo(a).